


## ТАМЕКИ – ӨЛҮМДҮН ГЛОБАЛДУУ ФАКТОРУ

Тамеки – өндүрүүчү тарабынан каралгандай керектеген учурда өлүмгө алып келген жалгыз легалдуу сатылуучу керектөөчүлүк товар. Тамеки буюмдарын керектөө 25тен ашуун инфекциялык эмес оорулардын (ИЭО) өнүгүшүнө алып келет.



1-сүрөт. Дүйнөдө 2005-2030-жылдары тамеки керектөөгө байланыштуу өлүмдөрдүн топтолгон саны

2005-жылдан 2030-жылга чейин тамеки дүйнө жүзүндө 175 миллион адамдын өмүрүн алып кетти<sup>1</sup>. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун (ДССУ) изилдөөлөрүнүн маалыматы боюнча тамеки тартуу коомдун эң өндүрүмдүү бөлүгүн жабыркатат. 35 – 69 жаштагы 30% эркектер тамекиден көз жумушат. Тамеки төмөнкүлөргө себептүү:

- 95% - өпкө рагынан болгон бардык өлүмдөрүнө;
- 92% - эрин, ооз көңдөйү, кекиртектин рагына;
- 78% - кызыл өңгөч, ашказан рагына;
- 80% - өпкөнүн обструктивдүү өнөкөт ооруларынан (ӨӨӨӨ);
- 30% - жүрөк-кан тамыр ооруларына (ЖКТО).

Кыргыз Республикасында (КР) тамекини керектөөгө байланыштуу калктын өлүмүнүн жана жашоо узактыгынын түзүмү 1 – 4-таблицааларда берилди.

<sup>1</sup> - Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Medicine, 2006, 3(11): e 442.

## 1-табл. Кыргыз Республикасында тамекиге байланыштуу жалпы өлүмгө учуроолор

35-69 жаштагы **28%** эркектер жана 70 жаштан ашкан **17%** эркектер тамеки тартуунун себебинен **каза болушту**<sup>2</sup>

**Аялдар арасында** жашына жараша - **4% жана 5%**

## 2-табл. Тамекиден болгон өлүмдөргө байланыштуу жашоонун узактыгын жоготуунун деңгээли

	35-69 жаш	70 жаштан ашкандар	35 жаш жана андан ашкандар
Каза болгон КР жарандарынын жашоо узактыгын жоготушу	<b>21 жыл</b>	<b>7 жыл</b>	<b>16 жыл</b>

## 3-табл. Кыргыз Республикасында бардык онкологиялык оорулардын арасында тамекиге байланыштуу өлүмдөрдүн деңгээли

	35-69 жаш	70 жаштан ашкандар
<u>Эркектер</u>	<b>42%</b>	<b>31%</b>
<u>Аялдар</u>	<b>3%</b>	<b>6%</b>

## 4-табл. 35-39 жаштагы топто тамекиге байланышкан негизги инфекциялык эмес оорулардан Кыргыз Республикасында жалпы өлүмдөрдүн түзүмү

	эркектер, n (%)	аялдар, n (%)
Өпкө рагы	<b>344/375<sup>3</sup> (92%)</b>	<b>20/66 (30%)</b>
ЖКТО	<b>751/2709 (28%)</b>	<b>161/1963 (8%)</b>
ӨӨӨӨ	<b>490/695 (71%)</b>	<b>69/383 (18%)</b>
Башка оорулар	<b>209/2323 (10%)</b>	<b>15/1035 (2%)</b>

Ошентип, өлүмдөр түзүмүндө **үч эң негизги оорулардын** тамеки менен себептик-кесепеттик байланышы бар - булар

- 1) ЖКТО (инфаркт, стенокардия, гипертониялык оору, инсульт, буттардын гангренаасы ж. б.),
- 2) онкологиялык оорулар (өпкө рагы, эрин, ооз көңдөйүнүн органдарынын, ашказандын рагы),
- 3) ӨӨӨӨ (өнөкөт бронхиттер, аллергиялык бронхиттер, бронхит астма, өпкө эмфиземасы).

<sup>2</sup> - Richard Peto и др. в книге: Mortality from smoking in developed countries 1950 – 2000. Indirect Estimates from National Vital Statistics. New York, 1994, 553p.

<sup>3</sup> Тамеки тартууга байланышкан өлүмдөрдүн саны/ар бир онкологиядан өлүмдөрдүн жалпы саны бул жерде жана мындан ары